

# ANAPOLON 50 mg Filmtabletten

Oxymetholon

**Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, bevor Sie beginnen**  
**Verwenden Sie dieses Arzneimittel, da es wichtige Informationen enthält**  
**Tanten für dich.**

Bewahren Sie diese Broschüre auf. Möglicherweise müssen Sie sie erneut lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt  
Ihr-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Praktiker.

- Dieses Medikament wurde - nur - für Sie verschrieben.

Sie müssen kein anderes Persoane geben. Le-can-do-bad-even-if-  
Au-gleiche-Anzeichen-der-Krankheit-wie-Sie.

— Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

an Ihren Apotheker oder Ihre Krankenschwester

Einschließlich aller möglichen Nebenwirkungen, die im Wohlstand nicht erwähnt werden  
pect.-Standpunkt-I-4.

**Was Sie in dieser Broschüre finden:**

1. Was ist Anapolon und wofür wird es verwendet?

2. - Was Sie wissen müssen, bevor Sie Anapolon verwenden

3. - Wie man Anapolon benutzt

4. Mögliche Nebenwirkungen

5. Wie lagere ich Anapolon?

6. Der Inhalt des Pakets und andere Informationen

**1. Was ist Anapolon und wofür wird es verwendet?**

Anapolon-Tabletten-werden-in-Zeit-Therapie-von-Rekuperare- verwendet

In-Pathologien:

— Störungen der Proteinsynthese.

— Kachexie verschiedener Genese.

- Trauma, - Verbrennungen - gewaltig

— Nach - Infektionskrankheiten - und - Bestrahlung.

Muskeldystrophie.

- Osteoporose

— Stickstoff-Negativ-Balance-in-Corticosteroid-Therapie.

- hypoplastische - und - aplastische Anämie.

**2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie Anapolon verwenden**

Verwenden Sie nicht-Anapolon:

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen den Wirkstoff sind oder  
eine der anderen Komponenten von Anapolon.

- wenn Sie schwanger sind oder stillen

- Zusätzliche Kontraindikationen sind Prostatakrebs

Brustkrebs bei Männern, ischämische Herzkrankheit, Arteriosklerose

schwere -insuffizienzja-Leber-und-Niere-Prostatita-akut, chronisch und.

Anapolon-Tabletten werden für Kinder und Jugendliche nicht empfohlen

Cent-nach-Alter-in-18-Jahren -datoritā-Mangel-Daten-über-Sicherheit-und-

Wirksamkeit.

**Seien Sie besonders vorsichtig mit Anapolon-Tabletten**

Es ist verboten, die empfohlenen Dosen zu überschreiten.

Der Nutzen für die Frauen muss bewertet und das Risiko bewertet werden

Bill-of-Treatment-in-Sight-of-Action von Androgen-Präparatu

lui.-La-Emergenz-erstes-Zeichen-der-Pacientelor-Virilisierung (ingroşarea-

Stimme-Hirsutismus, -acnee, -clitoromegalie) -administration-be-stopatā-

um irreversible Veränderungen zu vermeiden.

Vorbereitung-wird-durch-Vorsicht-zu-Schaden-Funktion-Herz gegeben -

Hochdruck, -afectarea-Funktion-Leber-und-Niere-Epilep-

sie, -migrenā-and-glaukoma- (Spannungsokular) -einschließlich-in-antece-

dente.-On-während-der-Behandlung-wird-empfohlen-Kontroll-Sistematik-

Al-Spannung-Intraokular-die-Ursache-Retention-möglich-zum-Natrium-lon

und Wasser im Körper. Es ist möglich, die Funktion der Leber zu verändern

Daher ist nach einer Behandlung von Behandlung zu Behandlung von vier Wochen die empfohlene

troll-tool-hepatice.-vor-der-start-behandlung und anschließend -pe-

während seiner - der empfohlenen Leistungskontrolle der rektalen Prostata.

In-Diabetes-Mellitus-Anpassung-empfohlen-und-Dosispräparate,

tihiperglycemice.

Bei-Patienten-mit-bösartigen-Tumor-Behandlung-Dauer-der-Willen-Bestimmung-

in-einem-Individuum-und-in-Funktion-von-Parametern-hepatici.-A-to-control-

systematisch-und-Cholesterin-Lipidämie.

**Verwendung anderer Arzneimittel**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker

wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben, einschließlich

von-denen-ohne-Rezept veröffentlicht.

Andere Medikamente (Medikamente, die den Glukosespiegel senken)

Blut genannt Anti-Diabetes-und-so genannte Derivate von Cumarin-utili-

zur Verhinderung der Blutgerinnung eingesetzt) kann die Wirkung von Ana beeinflussen

polon.-auch-Anapolon-kann-Potenz-Effekt-hepatotoxisch-al-

einige Medikamente.

Auch Medikamente aus der Glukokortikoidgruppe,

Corticoide, -präparatele-nach-Gehalt-von-Natrium-und-Lebensmittel-reich-in

Potenzieren Sie die Natrium-zurückhaltende Flüssigkeit-zu-Körper-Risiko-Discrese

ment-Ödem, -intensiveä-Eruptionen-Akne.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenden Sie sich zur erneuten Verabreichung an Ihren Arzt oder Apotheker.

Bestellung vor der Einnahme eines Medikaments. Anapolon-nicht-muss-

Ladezeit und Stillzeit.

**Maschinen fahren und benutzen**

Die Behandlung mit Anapolon hat keine Auswirkungen auf die Kapazität von Fahrzeugen und Maschinen zu fahren.

#### **Wichtige Informationen zu einigen Inhaltsstoffen von Anapolon**

Anapolon-Tabletten enthalten Laktose. Patienten mit erektiler Dysfunktion, Laktose-Intoleranz, Laktose-Defizit (Lapp) oder Malabsorptionssyndrom der Glucose-Galactose-muss nicht verwendet werden. Diese Medizin.

Anapolon-haltige Tabletten, RB @ C-Farbstoff und Gelb-Nr-6- (E110) - was -seiten-allergisch sein kann.

#### **3. Wie benutzt man Anapolon?**

Anapolon muss immer in der Dosis, in der Form und für verwendet werden Zeitraum, in dem der Arzt Sie verschrieben hat.

Die für Erwachsene empfohlene Tagesdosis beträgt 1-5 mg / kg / Dosis-zi.,

Die übliche-ist-von-wirksam-1-2-mg / kg / Tag-aber-kann-erforderlich-sein-und-Dosis-Mai-

Daher werden die Dosen individualisiert. Die Antwort erfolgt nicht Sofortige Behandlung-dieses-Minimums-ist-3-6-luni.-Patienten-mit-aplastische Anämie, angeborene Behandlung, die eine kontinuierliche Dosis von - durch Instandhaltung

#### **Art der Verabreichung**

Be-about-oralä.-Tabletten-beschichtet-be-inghiți- gegeben werden

Sie ganz-mit-einer-Menge-genug-für-Lichid.-Tabletten-nicht-muss-geteilt -sfărâmate-oder gemischt.

#### **Wenn Sie mehr Anapolon verwendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie mehr Tabletten eingenommen haben oder glauben, Sie hätten mehr Tabletten eingenommen mehr als nötig (Überdosierung), informieren Sie sofort Ihren Arzt

neavoastă-and-show-you-at-the-close-May-unit-medicalä.-

Bringen Sie Behälter und Drogen mit.

Fälle von Überdosierung wurden nicht gemeldet. Im Falle des Missbrauchs von Präparaten

Sie, die Oximetolon enthalten (Verabreichung von Dosis zu hoher Qualität von)

Heilung-anabol) -es-Register-Seite-schwere Seite-endokrine -metabolisch und psychisch.

#### **Wenn Sie vergessen, Anapolon einzunehmen**

Wenn Sie eine Einzeldosis einnehmen möchten, die Sie verpasst haben - Nehmen Sie weg, was Sie amintitiți.-

Mit all diesen kommen - wenn es Zeit ist, zu dösen

Als nächstes nehmen Sie -no-May-Dosis omisă. Nehmen Sie nicht eine doppelte Dosis-für-a-kompensieren a-Dosis vergessen.

Wenn Sie zusätzliche Fragen zu dieser Medizin haben

Sie sollten sich an Ihren Arzt oder Apotheker wenden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Anapolon abbrechen**

Sie müssen Anapolon so lange wie angegeben weiter verwenden.

Ihr Arzt. Brechen Sie die Einnahme des Arzneimittels nicht ab

Free-to-Talk-Mai-zuerst-mit-Ihrem-Arzt-oder-Apotheker.

Wenn Sie zusätzliche Fragen zu dieser Medizin haben

Sie sollten sich an Ihren Arzt oder Apotheker wenden.

#### **4. Mögliche Nebenwirkungen**

Wie alle Medikamente kann Anapolon Nebenwirkungen verursachen,

mit all dem, was niemals allen Menschen erscheint.

Anapolon-Tabletten in therapeutischen Dosen sind unwahrscheinlich

verursacht Nebenwirkungen. Bei längerer Behandlung

Die folgenden wurden als nachteilig angesehen (nicht das verfügbare Datum).

Die Frequenz):

Hepatică. Tumoren, Hypertrophie ---- La-ältere-und-oder-das-Prostatakarzinom.

Änderungen in der Blutanalyse, Koagulare-niedrig-zu-Blut-zu-TEN

Zahn-zu-Blutung.

Side-by-Hipersensibilitate.-

Gonadotropinei - Sekretionsunterdrückung (de-stimulierendes hormon-sexuelles).

Bei Frauen treten Anzeichen einer Virilisierung auf (z. B. Akne, Haarausfall,

Peci-by-type-male -ingroșarea-irreversibile-a-stamp-voice -disme-

Nore, -hipertrofia-klitoral) .- Răgușirea-kann-das-erste-Zeichen-der-Veränderung von sein

Kationenton, der langfristig und manchmal irreversibel sein kann.

Amenorrhoe und Hemmung-spermatogenezei.-

Ginecomastie- (Erhöhung der Brustdrüse) bei Männern.

Change-Libido.

La-Boys-of-Age-präpubertär die-kann-sehen-Erektion-häufig-und-

Penis-zu-Mädchen erhöhen --- Tritthaarigkeit-Scham-und-Hyper-

trophisch-klitoral.

Flüssigkeitsretention, Ödeme durch periphere Regionen, -hipercalcemie- (Zunahme der Ionisation)

ihr-von-Kalzium-zu-Blut) - die-Männer-und-Frauen --- Progressions-Atherosklerose-

(Krankheit der Unterwerfung eines Fettes in Intima-Gefäße, Arterien genannt).

Übelkeit, - Wir reduzieren die Lust am Essen.

Störungsfunktion-Leber-Colestază- (schwer freisetzbare-von-Bi-

lei) - icter- (gelber Farbstoff in der Haut).

Akne-Hirsutismus- (abnormales Wachstum der Haare) -nesemnificativ.

Retention Natriumionen von Wasser und Körper.

Erhöhung der Konzentration von Parametern in der Biochemie (ureei-

im Blut, -able-Nitrat-positiv, -hipercalcemie) -in-spezial-zu-Patienten, -

die sich an ein Regime halten, strikt zu Bett und bei Patienten mit Krebs-Mamar-

metastatische.-Modificarea- (positive) -indicilor-Leber-Funktion.

Wenn irgendwelche Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder wenn beobachtet wird

Alle Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht erwähnt werden, bitte

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder.

#### **Nebenwirkungen melden**

Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

an Ihren Apotheker. Dazu gehören mögliche Reaktionen.

Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht erwähnt werden. - Sie können auch

Siehe Side-by-Side-Direct-National-Way-System,

De-Reporting -ale-Details-die-auf-der-Website-Agentiei- veröffentlicht werden

Arzneimittel- und Medizinprodukte: -www.amed.md-or-

E-Mail: -farmacovigilenta@amed.md.

Durch die Meldung von Nebenwirkungen können Sie zur Bereitstellung von Informationen beitragen.

Weitere Informationen zu dieser Produktsicherheit.

#### **5. Wie lagere ich Anapolon?**

Ein Copiilor, der den Anblick und die Reichweite nicht zulässt.

A, um den Ort des Lichts geschützt und bei Temperaturen unter 25 ° C geschützt zu halten.

Verwenden Sie nicht-Anapolon-nach-Tag-des-Ablaufs-eingegeben-die-Packung-nach-Ablaufdatum "EXP" - um sich auf den letzten Tag der Frage zu beziehen.

Es sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich, Medikamente jedoch nicht

über Wasser geworfen werden-Haus-und-ein-Abfall-menajere.-

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Medikamente entfernen können, die nicht Ihr Mai sind.

Diese Schritte werden dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

#### **6. Paketinhalt und andere Informationen**

##### **Was Anapolon enthält**

Wirkstoff ist Oxymetholon.

1, das komprimierte Film enthaltende Oxymetholon-50-mg.

*Die anderen Komponenten sind:*

*Ader*

Das Magnesiumstearat -Kollidon-CL (Crosopovidon) - Ludipress- (Lactozä-Monohydrat, -polividonä, -crosopovidonä).

*Film*

Das Copolymer aus Polyvinylalkohol und Polyethylenglykol, Talk, -dioxid-von Titan, -mono- und -diglyceriden von Fettsäuren, -alkohol-polivinyllic, -colorant-FD & C Yellow Nr.6- (E110), - der gelbe Farbstoff Chinolin.

##### **Wie Anapolon aussieht und Inhalt der Packung**

Filmbeschichteter runder bikonvexer Farbgalbenä.-In-relevanten Abschnitt

Wir internen Cross-Content-die-Tablette-ist-die-Farbe-weiß.

##### **Packungsinhalt**

##### **Anapolon 50 mg Filmtabletten**

By-20-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.

Mit der Patientenbroschüre werden 3 Blasen platziert

Posteingang aus Pappe.

##### **Inhaber der Zulassungsbescheinigung und Hersteller**

##### **Inhaber der Registrierungsbescheinigung**

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL

str.-N-Grădescu, -4, -MD-2002 -oder.-Chisinau, Programm der Republik Moldau

##### **Der Hersteller**

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL

str.-Industrial -7 / A -MD-2091, -oder.-Singera Republic Programm Moldawien

##### **Dieser Prospekt wurde im Dezember 2018 genehmigt**

Detaillierte Informationen zu diesem Arzneimittel sind verfügbar

Site-Agency-Drug-and-Medico-Geräte (AMDM) -

<http://nomenclator.amed.md/>