

OXANDROLON 10 mg Filmtabletten

**Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, bevor Sie beginnen
Verwenden Sie dieses Arzneimittel, da es wichtige Informationen enthält
Tanten für dich.**

— Bewahren Sie diese Broschüre auf. - Möglicherweise müssen Sie sie lesen.

— Wenn Sie weitere Fragen haben, fragen Sie Ihren Arzt

Ihr-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Praktiker.

— Dieses Medikament wurde nur für Sie verschrieben.

Sie müssen nicht zulassen, dass andere - persoane.-Le-can-bad-bad-selbst-wenn-
Au-gleiche-Anzeichen-der-Krankheit-wie-Sie.

— Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Ihr-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Arzt. Diese Gebühr

schließen Sie mögliche Nebenwirkungen ein, die hier nicht erwähnt sind

Aussicht.-Standpunkt I-4.

Was Sie in dieser Broschüre finden:

1. Was ist Oxandrolon und wofür wird es verwendet?

2.- Was Sie vor der Anwendung von Oxandrolon wissen müssen

3.- Verwendung von Oxandrolon

4.- Mögliche Nebenwirkungen

5.- Aufbewahrung von Oxandrolon

6.- Inhalt - der Verpackung - und - anderer - Informationen

1. Was ist Oxandrolon und wofür wird es verwendet?

Oxandrolon-Tabletten werden während der Erholungsphase verwendet.

Pathologien, Störungen begleitet von Synthese-Proteinelor - (Kachexie-von-Di-

Versa-Genesis-Traume, -arsuri-weit, Stern-nach-Infektionskrankheit und der Iraker

Diera -Distrofia-Muskel -osteoporozä) -in-Therapie-durch-Kortikosteroide -

hypoplastische Anämie-und-aplastische -anemiile-hämolytisch-chronische.

2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie Oxandrolone anwenden

Verwenden Sie Oxandrolon nicht:

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen den Wirkstoff oder gegen sind
eine der anderen Komponenten des Arzneimittels Oxandrolon.

- wenn - Sie - schwanger sind - oder - stillen.-

- Zusätzliche Kontraindikationen sind Prostatakrebs, Karzinom

Brustkrebs bei Männern, - Brustkrebs bei Frauen, - Eierstockkrebs, -

Herzkrankheit, -aterosclerozä-schwere -insufficiența-Leber-und-

renale -nefrita, -sindromul-nephrotische -prostatită-akute, chronische und.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Es ist verboten, die empfohlenen Dosen zu überschreiten.

Bei Frauen der erwartete Nutzen und das Risiko von

Bill-of-Treatment-in-Sight-of-Action von Androgen-Präparatu

lui.-La-Emergenz-erstes-Zeichen-der-Pacientelor-Virilisierung (ingrosarea-

Stimme-Hirsutismus, -acnee, -clitoromegalie) -administration-be-stopată-

irreversible Veränderungen zu vermeiden.

Die Zubereitungen der Gruppe können die Unterdrückung des CoA-Faktors verursachen

Gulare-of-Blood-du-brauchst-eine-Überwachung-gründlich-einschließlich-zu-

Co-Use-by-Antikoagulantien.

Das Präparat wird Patienten mit Vorsicht verabreicht

Werkzeug-Herz -hipertensiune-Druck, -afectarea-Funktion-Leber-und-

Nierenepilepsie, Migräne und Glaukom (Spannungsookular)

ing-in-antecedente.-On-während-der-Behandlung-wird-empfohlen-con-

le-systematische-von-Blut-intraokular-die-Ursache-Retention-möglich-a-

Natriumion-von-Wasser-in-und-ist-möglicher Organismus.-Modifikationsfunktion-

Leber-von-dem-nach-einer-Behandlung-durch-Behandlung-durch-vier-Wochen-die-Empfehlung-

Mandat zur Kontrolle-Funktion-Leber.

Bei älteren Menschen kann man ein Wachstum der Inzidenz-Hypertrophie und finden.

Karzinom, Prostata-Sie-brauchen-ein-vor-Kontrolle-Riguros.-eines-ini-

diese Behandlung und danach-während-der-empfohlenen-efectuarea-

Kontrolle der rektalen Prostata.

In-Diabetes-Mellitus-Anpassung-empfohlen-und-Dosispräparate,

tihiperglicemie.

Bei-Patienten-mit-malignen-Tumor-Behandlungsdauer-ist-Ihre-Bestimmung-

in-einem-Individuum-und-in-Funktion-von-Parametern-hepatici.-A-to-controla-

systematisch-und-Cholesterin-Lipidämie.

Während der Behandlung mit Oxandrolon wird empfohlen, sich zu versichern

A-Aufnahme-Lebensmittel-geeignet-für-Protein-Lipid, -Glucid, -Vitamin-

und Mineralien.

Kinder und Jugendliche

Oxandrolon-Tabletten werden für Kinder und Jugendliche nicht empfohlen

Cent-nach-Alter-in-18-Jahren -datorită-Mangel-Daten-über-Sicherheit-und-

Wirksamkeitsvorbereitung für diese Altersgruppen.

Verwendung anderer Arzneimittel

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben, einschließlich

von-denen-ohne-Rezept ausgestellt.

Andere Medikamente (Medikamente, die den Glukosespiegel des Sän- senken)

GE-sogenannte Anti-Diabetes-und-sogenannte-Derivate von Cumarin-Utilizate-

um-Blutgerinnung zu verhindern) -kann-Einfluss-Wirkung-Oxandrolon.-

Oxandrolon-kann-Potenz-Wirkung-der-hepatotoxischen Medikamente.

Auch Arzneimittel aus der Glukokortikoidgruppe,

Corticoide, -präparatele-nach-Gehalt-von-Natrium-und-Lebensmittel-reich-in

Potenzieren Sie die Natrium-zurückhaltende Flüssigkeit-zu-Körper-Risiko-Discrese-

ment-Ödem, -intensiveä-Eruptionen-Akne.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
Korrekturen vor der Einnahme eines Medikaments. Oxandrolon-nicht-muss-Ladezeit und Stillzeit.

Maschinen fahren und benutzen

Die Behandlung mit Oxandrolon hat keine Auswirkungen auf die Kapazität.
of-the-drive-Fahrzeuge-und-zu-Gebrauch-Maschinen.

Wichtige Informationen zu einigen Inhaltsstoffen von Oxandrolone

Tabletten-Oxandrolon-haltige-Lactozä.-Patienten-durch-Krankheit-er-ditäre-seltene-der-Galactose-Intoleranz, -defizit-von-Lactazä- (Lapp) -oder-Malabsorptionssyndrom-der-Glucose-Galactose-muss-nicht-verwendet werden-Diese Medizin.

Oxandrolon-haltige Tabletten, RB @ C-Farbstoff-№-6-Gelb (E110), -was -seiten-allergisch sein kann.

3. Verwendung von Oxandrolone

Oxandrolon muss immer in der Dosis, Art und Weise der Anwendung verwendet werden.

Zeitraum, in dem der Arzt Sie verschrieben hat.

Das Ansprechen auf die Therapie kann variiert werden, und es passt das Dosis-Individuum an.

Die üblichen Dosen für Erwachsene betragen 2,5-20 mg pro Tag, unterteilt in 2-4-Preis.-

Dauer-Therapie-von-normalerweise-Konstituie-2-4-säptämäni.-

Art der Verabreichung

Be-about-oralä.-Tabletten-beschichtet-be-inghiți- gegeben werden

Sie ganz-mit-einer-Menge-genug-für-Lichid.-Tabletten-nicht-muss-geteilt -sfărâmate-oder gemischt.

Wenn Sie mehr Oxandrolon verwendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie-oder-Sie-das-haben-Sie-mehr-komprimiertes-Oxandrolon-

als-muss- (Überdosis) - sofort-Arzt-dumneavoastră- sagen

oder-stellen Sie sich-aus-dem-Mai-nahe-Einheit-Medizină vor.-Bringen Sie I-

AUSSENVERPACKUNG und Drogen, die bei Ihnen bleiben.

Fälle von Überdosierung wurden nicht semnalirt. Im Falle des Missbrauchs von Präparaten

Sie, die Oxandrolon enthalten (Verabreichung von Dosis zu hoher Qualität von)

Heilung-anabol -es-Register-Seite-schwere Seite-endokrine -metabolisch und psychisch.

Wenn Sie vergessen, Oxandrolone einzunehmen

Wenn Sie eine Einzeldosis einnehmen möchten, die Sie verpasst haben - Nehmen Sie weg, was Sie amintiți.-

Mit all diesen kommen - wenn es Zeit ist, zu dösen

Als nächstes nehmen Sie -no-May-Dosis omisă. Nehmen Sie nicht eine doppelte Dosis-für-a-kompensieren a-Dosis vergessen.

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Arzneimittel haben,

Sie sollten Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Wenn Sie die Einnahme von Oxandrolone abbrechen

Sie müssen Oxandrolone so lange wie angegeben weiter verwenden.

Doktor dumneavoastră.-nicht Stop-Administration-medicamentului-

Free-to-Talk-Mai-zuerst-mit-Ihrem-oder-Arzt-Apotheker.

Wenn Sie irgendwelche Fragen mehr mit Blick auf diese Medizin haben -

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Als All-Medikament -Oxandrolon-kann-Nebenwirkungen verursachen - mit all dem, was niemals allen Menschen erscheint.

Oxandrolon-Tabletten-in-therapeutischen Dosen-ist-weniger-wahrscheinlich-ill

Ursache-Wirkung-secundare.-In-während-der-Behandlung-verlängert-au-fost-beobachtet nachträglich nachteilig (nicht das verfügbare Datum)

Frequenz):

- Tumoren-Leber, -in-der-älteren-Hypertrophie-und / oder-Prostatakarzinom;

- Veränderungen - in - Blut - Analyse, - niedrige - Blut - Gerinnung - mit -Trend-the-Blooding;

- Überempfindlichkeitsreaktionen;

- Erregung, Schlaflosigkeit, Depression, Verwirrung;

- Unterdrückung der Sekretion von Hormonen der sexuellen Stimulation;

- bei - Frauen - - das Auftreten von - Anzeichen - von - Virilisierung - (z. B. - Akne, - Hirsutismus, -

Alopezie-eine-Art-männlich -ingroșarea-irreversibel-eine-Stempelmime -

Dysmenorrhoe, -hipertrofia-Klitoris) - răgușirea-can-be-first-semnal-change-Ton, der langfristig und ungleichmäßig sein kann

irreversibel;

- Mangel an Menstruationszyklus und Hemmung der Spermatogenese;

- Vergrößerung der Brustdrüsen bei Männern;

- Modifikation der Libido;

- Flüssigkeitsretention mit peripherem Ödem, Hyperkalzämie

Kalziumionen des Blutes) - die Männer und Frauen - Progressions-ATE

rosclerozei- (Krankheit-der-Unterwerfung-ein-Fett-zu-Intima-Vaselor-

Arterien genannt);

- Übelkeit, - Erbrechen, - Appetit - Reduktion;

- Leberfunktionsstörung, Cholestase (Schwierigkeitsgrad)

Galle) - icter- (gelber Farbstoff in der Haut);

- Akne, - Hirsutismus - (abnormal - Haarwuchs) - unbedeutend;

- Rückhaltung von Natriumionen und Wasser im Körper;

- Erhöhung - Konzentration - der - biochemischen - Parameter - im - Blut - (Harnstoff -

im Blut, -able-Nitrat-positiv, -hipercalcemie) -in-special-to-pacien-

Halten Sie, -die-eine-Diät-trifft-streng-zu-Bett-und-bei-Patienten-mit-Krebs-

Brustmetastasen -

- Modifikation - (Zunahme) - Indizes - Leberfunktion;

- Knochenschmerzen;

- Reizung-Blase-Harn;

- Priapismus.

Wenn irgendwelche Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder wenn beobachtet wird

Welche Nebenwirkungen auch immer - in der Packungsbeilage aufgeführt - bitte - il

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder.

Nebenwirkungen melden

Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

your-or-farmacistului.-Diese-schließen-alle-möglichen-nachteiligen-ein

nicht-in-der-Aussicht-erwähnt.-Ist-auch-reaktiv.-Sie-berichten

nachteilig-direkt-durch-das-System-nationale-de-Berichterstattung -ale-

welche-mehr-sind-auf-der-Website-Drogenagentur-veröffentlicht-und-

Medizinprodukte: -www.amed.md-or-

E-Mail: farmacovigilenta@amed.md.

Wenn Sie Nebenwirkungen melden, können Sie bei der Bereitstellung von Informationen helfen.

Halten Sie zusätzliche Sicherheit für die Medizin.

5. Wie lagere ich Oxandrolon?

Ein Copiilor, der den Anblick und die Reichweite nicht zulässt.

A, um den Ort des Lichts geschützt zu halten und die Temperatur unter 25 ° C zu halten.

Verwenden Sie Oxandrolone nicht nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum.

die nach 'EXP' .-

Ablaufdatum, um sich auf den letzten Tag der Frage zu beziehen.

Es sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

über Wasser geworfen werden-Haus-und-ein-Abfall-menajere.-

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Medikamente entfernen können, die nicht Ihr Mai sind.

Diese Schritte werden dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

6. Paketinhalt und andere Informationen

Was Oxandrolon enthält

Wirkstoff ist Oxandrolon.

1-haltiges filmbeschichtetes 10 mg Oxandrolon;

Die anderen Komponenten sind:

Ader

Das Magnesiumstearat -Kollidon-CL (Crospovidon) - Kollidon-25- (Polivinil-

pirolodonä) - Ludipress- (Lactosemonohydrat, -polividonä, -crospovidonä).

Film

Das Copolymer aus Polyvinylalkohol und Polyethylenglykol, Talk, Dioxid-De-

Titan - Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, -alkohol-polivinivlic, -colorant-

FD & C Gelb Nr.6- (E110), - Farbstoff FD & C Blau-Nr.1, FD & C - gefärbt

Blau-Nr.2-

Wie Oxandrolone aussieht und Inhalt der Packung

Filmbeschichtet-rund-bikonvex-von-Farbe-Albasträ.-In-Section-

Der interne Kreuzinhalt der Tablette ist die Farbe Weiß.

Packungsinhalt

Oxandrolon 10 mg Filmtabletten

By-25-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.

Up-4-Bliester-Paket-zusammen-mit-dem-Patienten-zu-Platz-in

Pappkarton.

Inhaber der Zulassungsbescheinigung und Hersteller

Inhaber der Registrierungsbescheinigung

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL

str.-N-Grădescu, -4, -MD-2002 -oder.-Chisinau, Programm der Republik Moldau

Der Hersteller

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL

str.-Industrial -7 / A -MD-2091, -oder.-Singera Republic Programm Moldawien

Dieser Prospekt wurde im Dezember 2018 genehmigt

Detaillierte Informationen zu diesem Arzneimittel finden Sie unter

Site-Agency-Drug-and-Medico-Geräte (AMDM) -

<http://nomenclator.amed.md/>