

## Parabolan

injizierbare Lösung

**HANDELSNAME**

Parabolan

**DCI des Wirkstoffs**

*Trenbolonum*

**KOMPOSITION**

1 ml Injektionslösung enthält:

*Wirkstoff:* Trenbolonhexahydrobenzylcarbonat - 100 mg;

*Hilfsstoffe:* Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Pfirsichöl.

**PHARMAZEUTISCHES FORMBLATT**

Injizierbare Lösung.

**BESCHREIBUNG DES MEDIZINPRODUKTS**

Transparente, hellgelbe bis ölige Lösung

gelb, mit einem charakteristischen Geruch.

**PHARMACOTHERAPEUTIC GROUP und ATC-Code**

Anabolika. ATC-Code: A14AB

**PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN**

Parabolan ist ein anaboles Steroid. In der Tat ein Derivat von

Nandrolon, Trenbolon unterscheidet sich signifikant von letzteren in seinen Eigenschaften.

Trenbolon ist aufgrund seiner strukturellen Besonderheiten keiner Wirkung ausgesetzt

5 $\alpha$ -Aromatase, kann aber selbst sowohl östrogene als auch

und gestagen (letzteres manifestiert sich in der Fähigkeit zu stimulieren

Progesteronrezeptoren).

Trenbolon ist das stärkste anabole Steroid, das es gibt - danach

Die Stabilisierungszeit des Androgenrezeptor-Trenbolons überschreitet

nicht nur Testosteron (über 3-mal mehr), sondern auch Nandrolon.

Stimuliert anabole Prozesse und hemmt katabolische Prozesse

von Glukokortikoiden. Führt zu erhöhter Muskelmasse, Reduktion

Fettdepots, verbessert Gewebetrophäen, fördert De-

Kalzium in den Knochen, hält Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Natrium und

Wasser im Körper.

Stimuliert die Erythropoietinsynthese und aktiviert anabole Prozesse in

Knochenmark, das bei gleichzeitiger Verabreichung von Arzneimitteln

Eisen manifestiert sich durch antianämische Wirkung. Hemmt die Gonadotropinsynthese

feines und endogenes Testosteron. In hohen Dosen hemmt es Spermatogen-

Kettenglied. Es kann das sexuelle Wachstum und die Entwicklung von Kindern stoppen.

**THERAPEUTISCHE HINWEISE**

Parabolan als Heilmittel mit überwiegend anaboler Wirkung ist

als Ergänzung in der komplexen Therapie von Erkrankungen verursacht durch

Ausbrüche des Proteinstoffwechsels mit negativer Stickstoffbilanz (Aufnahme

unzureichende, erhöhte Bedürfnisse oder Verluste):

Kachexie verschiedener Genese;

Riesige Verbrennungen;

Längere Verabreichung von Glukokortikoiden;

Hypo- und aplastische Anämie;

Muskelatrophie bei AIDS-Patienten (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

zitation);

Osteoporose.

**DOSIERUNG UND VERWALTUNGSVERFAHREN**

**Tief intramuskulär.**

Das Dosierungsschema wird individuell ausgewählt.

Erwachsene: 50-200 mg (Frauen - 50-100 mg) 1 Mal in 1-4 Wochen.

Die Dauer der Parabolanverabreichung hängt vom klinischen Ansprechen des Patienten ab.

und der Grad der Manifestation von Nebenwirkungen.

Die Behandlung wird vor dem Hintergrund einer proteinreichen Ernährung durchgeführt.

**NEBENWIRKUNGEN**

Die unten aufgeführten Nebenwirkungen werden nach der Häufigkeit klassifiziert

auf Geräten, Systemen und Organen. Die Frequenzgruppen nach

MedDRA: sehr häufig ( $\geq 1/10$ ), häufig ( $\geq 1/100$  und  $<1/10$ ),

ungewöhnlich ( $\geq 1/1000$  und  $<1/100$ ), selten ( $\geq 1/10000$  und  $<1/1000$ ) und

sehr selten ( $<1/10.000$ ), mit einer unbekanntem Frequenz (die nicht sein kann

aus den verfügbaren Daten).

**Hämatologische und lymphatische Erkrankungen:**

*Gelegentlich:* Änderungen in der Leukozytenformel,

*Sehr selten:* Hypokoagulation mit Blutungsneigung.

**Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen:**

*Häufig:* Beibehaltung oder Beendigung des Wachstums (Verkalkung der Epiphysenbereiche

röhrenförmiges Knochenwachstum);

*Gelegentlich:* Bei Männern und Frauen - Fortschreiten der Atherosklerose,

periphere Störungen, Leberfunktionsstörung,

**Störung des Bewegungsapparates:**

*Selten:* Schmerzen in langen röhrenförmigen Knochen.

**Erkrankungen des Genitaltrakts und der Brust:**

*Seltener:* bei Frauen - Symptome der Virilisierung, Funktionshemmung

Eierstock-, Menstruationsstörungen; bei Männern während der Vorbereitung

bertarä - Symptome einer Virilisierung, idiopathische Hauthyperpigmentierung;

in der postpubertären Phase - Gynäkomastie, Priapismus, Spermienhemmung

Genese, Blasenreizung.

*Selten:* bei älteren Menschen - Hypertrophie und / oder Prostatakrebs.

#### **KONTRAINDIKATIONEN**

Überempfindlichkeit gegen das Medikament, Prostatakrebs und Adenom, Krebs Brustkrebs bei Männern, Brustkrebs bei Frauen mit Hyperkalzämie, Eierstockkrebs, CPI (ischämische Herzkrankheit), schwere Atherosklerose, Nephritis, nephrotisches Syndrom, Leber- und Niereninsuffizienz, akute Prostatitis und chronische Krankheit, Schwangerschaft, Stillzeit, Säuglinge bis zur Reife sexuelle Seltenheit.

#### **Überdosis**

Fälle von Überdosierung wurden nicht gemeldet.

#### **BESONDERE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH**

Die Patienten sollten informiert werden, wenn sie Steroidanabolika verschreiben über mögliche Nebenwirkungen mit sofortiger ärztlicher Hilfe.

ihre Rity. Bei den ersten Anzeichen einer Virilisierung der Patienten (Verdickung

Die Verabreichung von Stimme, Hirsutismus, Akne, Klitoromegalie sollte gestoppt werden um irreversible Veränderungen zu vermeiden.

Präparate in dieser Gruppe können die Unterdrückung von Plasmafaktoren verursachen der Gerinnung II, V, VII, X, die eine genaue Überwachung erfordern, einschließlich bei gleichzeitiger Anwendung mit indirekten Antikoagulanzen.

Während der Behandlung müssen die Funktionsparameter überwacht werden Leberfunktion (Transaminasen, alkalische Phosphatase, Bilirubin) und Lipidspiegel (der Cholesterinspiegel und Lipoproteine niedriger Dichte Das). Bei älteren Menschen steigt die Inzidenz von Hypertrophie und Prostatakrebs, der eine strenge Kontrolle erfordert.

Bei Patienten, die hohe Dosen anaboler Steroide verwenden, ist dies erforderlich periodisches Absetzen von Hämoglobin und Hämatokrit aufgrund der Polizei mögliche Gründe.

#### **Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit:**

Die Verabreichung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist kontraindiziert.

#### **Auswirkungen auf die Fähigkeit, Fahrzeuge zu fahren und zu benutzen**

#### **Ausrüstung:**

Die Vorbereitung beeinträchtigt nicht die Fähigkeit, Fahrzeuge zu fahren oder zu benutzen Maschinen zu bedienen.

#### **Interaktionen mit anderen Medikamenten**

#### **UND ANDERE ARTEN VON INTERAKTIONEN**

Glucocorticoide, Mineralocorticoide, Corticotropin, Zubereitungen, die enthalten natriumreiche Lebensmittel und natriumreiche Lebensmittel verbessern die Retention von Erhöhen Sie im Körper das Risiko, Ödeme zu entwickeln, und verstärken Sie Hautausschläge Akne. Erhöht die Wirkung von Thrombozytenaggregationshemmern, Antikoagulanzen und Insulin orale Antidiabetika, verringert die Wirkung von Somatotropin und Derivaten Sie.

#### **PRÄSENTATION, VERPACKUNG**

Injektionslösung 100 mg / ml 1 ml in Ampullen.

5 oder 10 Ampullen zusammen mit der Anweisung zur Verabreichung sind in einzelnen Karton legen.

#### **LAGER**

Unter 25 ° C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### **GÜLTIGKEITSBEDINGUNGEN**

3 Jahre.

Nicht nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum verwenden!

#### **RECHTSSTELLUNG**

Es ist vorgeschrieben.

#### **DATUM DER LETZTEN TEXTPRÜFUNG**

September 2014.

#### **ZERTIFIKAT DES REGISTRIERUNGSINHABERS**

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Republik Moldawien

#### **NAME UND ADRESSE DES HERSTELLERS**

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Str. N. Grădescu, 4, Mun. Chişinău, Republik Moldau

#### **Im Falle von gemeldeten Nebenwirkungen**

**Abteilung für Pharmakovigilanz der Arzneimittelbehörde und Medizinprodukte (Tel. 0 (22) 88-43-38).**