

PAKETBLATT: INFORMATIONEN FÜR BENUTZER / PATIENTEN

TURANABOL 10 mg Filmtabletten

Clordehidrometiltestosteron

Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, bevor Sie beginnen

Verwenden Sie dieses Arzneimittel, da es wichtige Informationen enthält

Tanten für dich.

— Bewahren Sie diese Broschüre auf. - Möglicherweise müssen Sie sie lesen.

— Wenn Sie weitere Fragen haben, fragen Sie Ihren Arzt

Ihr-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Praktiker.

— Dieses Medikament wurde nur für Sie verschrieben.

Sie müssen nicht zulassen, dass andere - persoane.-Le-can-bad-bad-selbst-wenn-
Au- gleiche- Anzeichen- der- Krankheit- wie- Sie.

— Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Ihr-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Arzt. Diese Gebühr

schließen Sie mögliche Nebenwirkungen ein, die hier nicht erwähnt sind

Aussicht.-Standpunkt 1-4.

Was Sie in dieser Broschüre finden:

1. Was Turanabol ist und wofür es verwendet wird

2.- Was müssen Sie wissen, bevor Sie Turanabol verwenden?

3.- Verwendung von Turanabol

4.- Mögliche Nebenwirkungen

5.- Wie lagert man Turanabol?

6.- Inhalt - der Verpackung - und - anderer - Informationen

1. Was Turanabol ist und wofür es verwendet wird

Turanabol-Tabletten-werden-in-der-Zeit-der-Erholung-in-de- verwendet

Tologiile-begleitet-von-Synthese-Proteinelor - Störungen (Kachexie-des-Tauchers-

Entstehung, - Trauma, - ausgedehnte Verbrennungen, - Zustand - nach - infektiös und

Diera -Distrofia-Muskel -osteoporozä) -in-Therapie-durch-Kortikosteroide -

hypoplastische Anämie-und-aplastische -anemiile-hämolytisch-chronische -anämie-

of-Nierenversagen-chronisch-Limfoame und Leukämie, -trombocitope-

Nie-idiopathisch.

2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie Turanabol verwenden

Verwenden Sie nicht-Turanabol:

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen den Wirkstoff oder gegen sind

eine der anderen Komponenten von Turanabol.

- wenn - Sie - schwanger sind - oder - stillen.-

- Zusätzliche Kontraindikationen sind Prostatakrebs, Karzinom

Brustkrebs bei Männern, - Brustkrebs bei Frauen, - Eierstockkrebs, -

Herzkrankheit, -aterosclerozä-schwere -insufficiēta-Leber-und-

renale -nefrita, -sindromul-nephrotische -prostatitā-akute, chronische und.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wir-verbieten-überwinden-Dosis-empfehlen.-La-Verabreichung, Vorbereitungen in

König-die-Frauen-haben-erwartet-und-Nutzen-Risiko-möglich-bewertet-

Behandlung-in-Sicht-der-Wirkung von Androgen-Preparatului.-La-

das Auftreten des ersten Signals zur Pacientelor-Virilisierung (Verdickungsstimme -

Hirsutismus, -acnee, -clitoromegalie) -administration-must-stop-pen-

Um irreversible Veränderungen zu vermeiden.

Die Zubereitungen der Gruppe können die Unterdrückung des CoA-Faktors verursachen

Gulare-of-Blood-du-brauchst-eine-Überwachung-gründlich-einschließlich-zu-

Co-Use-by-Antikoagulantien.

Das Präparat wird Patienten mit Vorsicht verabreicht

Werkzeug-Herz -hipertensiune-Druck, -afectarea-Funktion-Leber-und-

Nierenepilepsie, Migräne und Glaukom (Spannungskular)

ing-in-antecedente.-On-während-der-Behandlung-wird-empfohlen-con

le-systematische-von-Blut-intraokular-die-Ursache-Retention-möglich-a-

Natriumion-von-Wasser-in-und-ist-möglicher Organismus.-Modifikationsfunktion-

Leber-von-dem-nach-einer-Behandlung-durch-Behandlung-durch-vier-Wochen-die-Empfehlung-

Mandat zur Kontrolle-Funktion-Leber.

Bei älteren Menschen kann man ein Wachstum der Inzidenz-Hypertrophie und finden.

Karzinom, Prostata-Sie-brauchen-ein-vor-Kontrolle-Riguros.-eines-ini-

diese Behandlung und danach-während-der-empfohlenen-efectuarea-

Kontrolle der rektalen Prostata.

In-Diabetes-Mellitus-ist-empfohlene-Dosisanpassung-Präparate -----

antihyperglykämisch.

Bei-Patienten-mit-malignen-Tumor-Behandlungsdauer-ist-Ihre-Bestimmung-

in-einem-Individuum-und-in-Funktion-von-Parametern-hepatici.-A-to-controla-

systematisch-und-Cholesterin-Lipidämie.

Während der Behandlung mit Turanabol wird empfohlen, bereitzustellen

Nahrungsaufnahme-das-geeignete-Protein-Lipid, -Glucid, Vitamin und Mineral.

Kinder und Jugendliche

Turanabol-Tabletten werden für Kinder und Jugendliche nicht empfohlen.

Cent-nach-Alter-in-18-Jahren -datoritā-Mangel-Daten-über-Sicherheit-und-

Wirksamkeitsvorbereitung für diese Altersgruppen.

Verwendung anderer Arzneimittel

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

wenn nehmen oder haben die vor kurzem-irgendwelche-anderen-Drogen-einschließlich-dintre- genommen

die-ohne-verschreibungspflichtige-Medizin veröffentlicht.

Andere (Arzneimittel) (Arzneimittel, die den Glukosespiegel senken

Blut genannt Antidiabetika und sogenannte Cumarinderivate.

verwendet, um die Blutgerinnung zu verhindern) kann die Wirkung beeinflussen

Turanabol.-Turanabol-kann-Potenz-die-hepatotoxische Wirkung-von-mir-

Droge hat.

Auch Medikamente der Gruppe Glukokortikoide-Mineralocor-

Ticoizi, -Vorbereitung mit natriumreichem Lebensmittel und Natrium-

Verbessert die Flüssigkeitsretention im Körper, erhöht das Risiko der Entwicklung

Ödeme, -intensiveä-Eruptionen-Akne.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Vor dem Einnehmen eines Medikaments bestellen. Turanabol-not-must-Ladezeit und Stillzeit.

Maschinen fahren und benutzen

Die Behandlung durch Turanabol hat keine Auswirkungen auf die Kapazität von Fahrzeugen und Maschinen zu fahren.

Wichtige Informationen zu einigen Inhaltsstoffen von Turanabol

Turanabol-haltige Tabletten enthalten Laktose. Patienten mit ditare-seltene-der-Galactose-Intoleranz, -defizit-von-Lactazä- (Lapp) -oder-Malabsorptionssyndrom-der-Glucose-Galactose-muss-nicht-verwendet werden-Diese Medizin.

Tabletten - Turanabol - enthalten - Farbstoff - FD @ C - Gelb - № - 6 - (E110), - was -seiten-allergisch sein kann.

3. Wie benutzt man Turanabol?

Turanabol-muss-immer-verwendet-werden, um-Modul-und-für-Peri- zu dosieren Oada-die-Zeit-des-Arzt-erschieden Sie.

Das Ansprechen auf die Therapie kann variiert werden, und es passt das Dosis-Individuum an.

Dosis-de-Turanabol-für-Erwachsene-pro-Tag-ist-20-50-mg.-Durata-Gürtel als ungeeignet für die Zeit von 2 bis 6 Wochen.

Art der Verabreichung

Be-about-oralä.-Tabletten-beschichtet-be-inghiți- gegeben werden Sie ganz-mit-einer-Menge-genug-für-Lichid.-Tabletten-nicht-muss-geteilt -sfărâmate-oder gemischt.

Wenn Sie mehr Turanabol verwendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie-oder-Sie-das-haben-Sie-mehr-komprimiert-Turanabol-als-muss- (Überdosis) - sofort-Arzt-Dumnevoas-TRA-and-Show-you-at-the-Close-Unit-May-Bring Medicalä.

Paket oder Drogen, die bei Ihnen bleiben.

Fälle, in denen eine Überdosierung nicht semnalisiert war, im Falle eines Missbrauchs von Zubereitungen in

Raten, die Clordehidrometiltestosteron enthalten (Management-Dzelor-High-to-Quality-of-Cure-Anabolika) -es-Seite Zeichen-nachteilig-schwerer endokriner Metabolit und psychisch.

Wenn Sie vergessen, Turanabol einzunehmen

Wenn Sie eine Einzeldosis einnehmen möchten, die Sie verpasst haben - Nehmen Sie weg, was Sie amintiți.

Mit all diesen kommen - wenn es Zeit ist, zu dösen

Als nächstes nehmen Sie -no-May-Dosis omisä. Nehmen Sie nicht eine doppelte Dosis-für-a-kompensieren a-Dosis vergessen.

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Arzneimittel haben,

Sie sollten Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Wenn Sie die Einnahme von Turanabol abbrechen

Notwendigkeit, Turanabol weiterhin zu verwenden, solange Sie mich angegeben haben

Unterbrechen Sie nicht die Verabreichung des Arzneimittels.

Free-to-Talk-Mai-zuerst-mit-Ihrem-oder-Arzt-Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Arzneimittel haben,

Sie sollten Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Als All-Medikamente-Turanabol-kann-Nebenwirkungen-verursachen, -cu-all das, was niemals alle Menschen erscheinen lässt.

Turanabol-Tabletten-in-therapeutischen Dosen-ist-weniger-wahrscheinlich-pro

VOAC-Effekte-secundare.-in-Time-Therapie-wurden-erweitert-Beobachtung

Wolle nach Reaktion - nachteilig (Datum der Häufigkeit nicht verfügbar):

- Tumoren-Leber, -in-der-älteren-Hypertrophie-und / oder-Prostatakarzinom;

- Veränderungen - in - Blut - Analyse, - niedrige - Blut - Gerinnung - mit -

Trend-the-Blooding;

- Überempfindlichkeitsreaktionen;

- Erregung, Schlaflosigkeit, Depression, Verwirrung;

- Unterdrückung der Sekretion von Hormonen der sexuellen Stimulation;

- bei - Frauen - - das Auftreten von - Anzeichen - von - Virilisierung - (z. B. - Akne, - Hirsutismus, -

Alopezie-eine-Art-männlich -ingroșarea-irreversibel-eine-Stempelstimme -

Dysmenorrhoe, -hipertrofia-Klitoris) - răgușirea-can-be-first-semnal-change-Ton, der langfristig und ungleichmäßig sein kann

irreversibel;

- Mangel an Menstruationszyklus und Hemmung der Spermatogenese;

- Vergrößerung der Brustdrüsen bei Männern;

- Modifikation der Libido;

- Flüssigkeitsretention mit peripherem Ödem, Hyperkalzämie

Kalziumionen des Blutes) - die Männer und Frauen - Progressions-ATE

rosclerozei- (Krankheit-der-Unterwerfung-ein-Fett-zu-Intima-Vaselor-

Arterien genannt);

- Übelkeit, - Erbrechen, - Appetit - Reduktion;

- Leberfunktionsstörung, Cholestase (Schwierigkeitsgrad

Galle) - icter- (gelber Farbstoff in der Haut);

- Akne, - Hirsutismus - (abnormal - Haarwuchs) - unbedeutend;

- Rückhaltung von Natriumionen und Wasser im Körper;

- Erhöhung - Konzentration - von - parametrischen - Biochemikalien - im Blut

(Hamstoff-zu-Blut-fähig-Nitrat-positiv, -hipercalcemie) -in-special-to-

Patienten, die eine Diät treffen, die ausschließlich zu Bett geht, und bei Patienten mit

und Brustkrebs, metastasierend -

- Veränderung - (Zunahme) - Indizes - Leberfunktion.

- Knochenschmerzen;

- Reizung-Blase-Harn;

- Priapismus.

Wenn irgendwelche Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder wenn beobachtet wird

Welche Nebenwirkungen auch immer - in der Packungsbeilage aufgeführt - bitte - il

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder.

Nebenwirkungen melden

Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
your-or-farmacistului.-Diese-schließen-alle-möglichen-nachteiligen-ein
nicht in der Aussicht erwähnt. Ist auch reaktiv. Sie berichten
nachteilig-direkt-durch-das-System-nationale-de-Berichterstattung -ale-
welche-mehr-sind-auf-der-Website-Drogenagentur-veröffentlicht-und-
Medizinprodukte: -www.amed.md-or
E-Mail: farmacovigilenta@amed.md.
Wenn Sie Nebenwirkungen melden, können Sie helfen, die Informationen bereitzustellen.
Weiter zur Arzneimittelsicherheit.

5. Wie lagere ich Turanabol?

Ein Copiilor, der den Anblick und die Reichweite nicht zulässt.
A, um den Ort des Lichts geschützt zu halten und die Temperatur unter 25 ° C zu halten.
Verwenden Sie nicht-Turanabol-nach-Tag-des-Ablaufs-ingegeben-die-Packung ---
die nach 'EXP' .-
Ablaufdatum, um sich auf den letzten Tag der Frage zu beziehen.
Es sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.
über Wasser geworfen werden-Haus-und-ein-Abfall-menajere.-
Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Medikamente entfernen können, die nicht Ihr Mai sind.
Diese Schritte werden dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

6. Paketinhalt und andere Informationen

Was Turanabol enthält

Wirkstoff ist Clordehidrometiltestosteronă.
1-haltiges filmbeschichtetes 10 mg-Clordehidrometiltestosteron.
Die anderen Komponenten sind:

Ader

Das Magnesiumstearat -Kollidon-CL (Crospovidon) - Ludipress- (Lactoză-
Monohydrat, -polividonă, -crospovidonă).

Film

Das Copolymer aus Polyvinylalkohol und Polyethylenglykol, Talk, Dioxid-De-
Titan - Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, -alkohol-polivinivlic, -colorant-
FD & C Yellow Nr.6- (E110), - der gelbe Farbstoff Chinolin.

Wie Turanabol aussieht und Inhalt der Packung

Filmbeschichteter runder bikonvexer Farbgalbenă.-In-relevanter Abschnitt
Wir internen Cross-Content-die-Tablette-ist-die-Farbe-weiß.

Packungsinhalt

Turanabol 10 mg Filmtabletten

By-25-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.
Up-4-Bliester-Paket-zusammen-mit-dem-Patienten-zu-Platz-in
Pappkarton.

Inhaber der Zulassungsbescheinigung und Hersteller

Inhaber der Registrierungsbescheinigung

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL
str.-N-Grădescu, -4, -MD-2002 -oder.-Chisinau, Programm der Republik Moldau

Der Hersteller

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL
str.-Industrial -7 / A -MD-2091, -oder.-Sîngera Republic Programm Moldawien

Dieser Prospekt wurde im Dezember 2018 genehmigt

Detaillierte Informationen zu diesem Arzneimittel finden Sie unter
Site-Agency-Drug-and-Medico-Geräte (AMDM) -
<http://nomenclator.amed.md/>