

STROMBAFORT

PAKETBLATT: INFORMATIONEN FÜR BENUTZER / PATIENTEN STROMBAFORT 10 mg Filmtabletten STROMBAFORT 50 mg Filmtabletten

Stanozolol

**Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, bevor Sie beginnen
Beginnen Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels, da es Informationen enthält
Ihnen wichtig.**

Bewahren Sie diese Broschüre auf. Möglicherweise müssen Sie sie erneut lesen.

— Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

von Ihrem-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Praktiker.

— Dieses - Medikament - wurde - nur - für Sie verschrieben

Sie müssen es nicht anderen Menschen geben. Es kann sie verletzen.

selbst wenn sie die gleichen Anzeichen der Krankheit wie Sie haben.

— Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Ihr Apotheker oder Ihre Krankenschwester

Diese umfassen alle möglichen Nebenwirkungen, die nicht erwähnt werden
diese-Perspektive.-Standpunkt-1-4.

Was Sie in dieser Broschüre finden:

1. Was ist Strombafort und wofür wird es verwendet?
- 2.- Was Sie wissen müssen, bevor Sie Strombafort verwenden
3. - Wie benutzt man Strombafort?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie lagere ich Strombafort?
6. Der Inhalt des Pakets und andere Informationen

1. Was ist Strombafort und wofür wird es verwendet?

Strombafort-Tabletten können während der Therapie angewendet werden.

Erholung in Pathologien, begleitet von einer Proteinsynthesestörung

Damen, -caşexia-der-verschiedenen-Genese-Traumele, -arsurile, -perioadele-

prä- und postoperative Erkrankungen, Infektionskrankheiten durch Bestrahlung, Infusionskrankheiten

Ciency, Nieren und Nebennieren -guşa-toxisch -distrofia-Muskel -OS-

Teoporoza, -ausgleichsnitrat-negativ-zur-Therapie-durch-Kortikosteroide -

Anämie, Hypo - und aplastisches Adjuvans zur Behandlung von TB -

Osteomyelitis, -astmului-bronchial -hepatitei.-

2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie Strombafort verwenden

Nicht verwenden-Strombafort:

- wenn - Sie - allergisch - (überempfindlich) - gegen - den Wirkstoff - oder - gegen - irgendjemanden sind

das zwischen-anderen-Komponenten-der-Vorbereitung-Strombafort.

- wenn Sie schwanger sind oder stillen

- Zusätzliche Kontraindikationen sind Prostata oder Karzinom

Karzinom und Brust-zu-Mann-Kardiopatie-ischämisch -aterosklerozä-

schwere -insuffizienz-a-Leber-und-Niere-Prostatita-akut, chronisch und.

Strombafort-Tabletten werden für Kinder nicht empfohlen

Teenager-mit-Alter-in-18-Jahren -datorită-Mangel-Daten-privind-

Sicherheit und Wirksamkeit.

Seien Sie besonders vorsichtig mit Strombafort-Tabletten

Es ist verboten, die empfohlenen Dosen zu überschreiten

Der erwartete Nutzen muss bei Frauen beurteilt werden

Risiko-mögliche-Behandlung-mit-dem-Anblick-Aktion-androge-

präparatului.-na-zum-ersten-Auftauchen bei-Zeichen-der-Pazi-Virilisierung

entelor- (Verdickungsstimme-Hirsutismus, -knie, -klitoromegalie) -admin-

istrarea-must-stop-um irreversible Veränderungen zu vermeiden.

Die Vorbereitung erfolgt durch Vorsicht, um die Funktion zu beschädigen.

Tausende -hipertensiune-Druck, -afectarea-Funktion-Leber-und-Niere -

Epilepsie, Migräne und Glaukom (Spannungsookular), einschließlich

antecedente.-On-während-der-Behandlung-wird-empfohlen-Kontrolle

systematisch-das-Blut-intraokular-die-Ursache-Retention-möglich-a-

Natriumionen und Wasser im Körper. Es ist möglich, sich zu verändern

Leberfunktion, daher-eine-Heilung-nach-Behandlung-um-4-pro-Woche

die Hände-empfohlene-Kontrollfunktion-Hepaticae.-vor-dem-zum-Ursprung

Behandlung und anschließend -auf-während-zu-empfehlen-efectuarea-

Kontrolle der rektalen Prostata.

In-Diabetes-Mellitus-wird-empfohlen-angepas-Dosis-Präparatelor- empfohlen

antihyperglykämisch.

Bei-Patienten-mit-bösartigen-Tumor-Behandlung-Dauer-den-Willen-abschrecken-

Hand-in-ein-Individuum-und-in-Funktion-von-Parametern-hepatici.-A-SE-

Kontroll-systematische Lipidämie und Cholesterin.

Verwendung anderer Arzneimittel

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben,

einschließlich derjenigen, die ohne Rezept ausgestellt wurden.

Andere Medikamente (Medikamente, die den Glukosespiegel senken)

Blut namens Antidiabetikum und so genannt

Cumarin - verwendet - um - Blutgerinnung zu verhindern - - kann

Einfluss-Effekt-Strombafort.-auch-Strombafort-can-

Potenzwirkung der hepatotoxischen Arzneimittel.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach

Empfehlungen-vor-der-Einnahme-irgendeines-Medikaments.-Strombafort-don '

während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Maschinen fahren und benutzen

Die Behandlung durch Strombafort hat keine Auswirkungen auf eine Kapazität

tivität, die Fahrzeug-zu-fahren-und-zu-benutzen-Maschinen.

Wichtige Informationen zu einigen Komponenten von

Strombafort

Strombafort-Tabletten enthalten Laktose. Patienten mit Seltene erbliche One-Intolerant-auf-der-Galactose-Defizit-von-Lactazä-(Lapp) -oder-Malabsorptionssyndrom-die-Galactose-Glucose-zu-kein-Tre-Buie-to-use-this-Medizin.

3. Wie benutzt man Strombafort?

Strombafort muss immer in der Dosis, im Modul und verwendet werden für den Zeitraum des Arztes, der Ihnen verschrieben wurde.

Die übliche Dosis ist wie folgt:

--- Erwachsene Anfangsdosis-10-20-mg / zi.-

Die Dosiserhaltung beträgt-a-5-10-mg / zi.-

--- Maximale Dosis 50 mg / 24 Stunden.

Bei einigen Patienten aufgrund der Abnahme der Häufigkeit und Schwere von Komitee-erbliches Angioödem der angepassten Dosis, Single-In Abhängigkeit-die-Antwort-Klinik.-Dosis-Original-ist-alle-zwei-mg-das-3-fache-a-zi.-La-Erhalten einer Reaktion auf eine positive Dosis, die Nr allmählich ein Intervall von einem bis zu drei Monaten pro 2 mg pro Tag.

Art der Verabreichung

Be-about-oral -. -Tabletten-beschichtet-be-in gegeben werden JOEL-ganz-mit-einer-Menge-Lichid.-ausreichend Comprimatele-nicht unterteilt werden, -sfärämate-or-gekaut werden.

Wenn Sie mehr Strombafort verwendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie mehr Tabletten eingenommen haben oder glauben, dass Sie sie eingenommen haben Strombafort als nötig (Überdosierung), sagen wir - sofort zu Ihrem Deich oder zum nächsten

Bringen Sie medizinischeä.-Einheit-Verpackung-und-Medikamente-rämase-mit dir.

Fälle von Überdosierung wurden nicht gemeldet. Bei Missbrauch hergestellt-welches-Metandienon enthält- (Großdosis-Verabreichung, die Qualität der Heilung-anabolen) Reaktionen -es-Register-nachteilig-schwerer endokriner Metabolit und psychisch.

Wenn Sie vergessen, Strombafort einzunehmen

Wenn Sie eine Einzeldosis einnehmen möchten, die Sie verpasst haben - Nehmen Sie weg, was Sie aminieren.

tiți.-mit-all-diesen-kommen-wenn-Zeit-zu-verwalten-

schlechte Dosis-nächste-keine-Mai-Dosis nehmen omisä.-keine-Dosis-Einnahme

Doppelte Kompensation einer vergessenen Dosis.

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich diese Medien an.

Produkt von -adresați Ihrem-Ihrem-Arzt-oder-Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Strombafort abbrechen

Sie müssen Strombafort so lange verwenden, wie Sie möchten

Von Ihrem Arzt angezeigt. Unterbrechen Sie die Verabreichung nicht

drogenfrei-zu-reden-Mai-zuerst-zum-Arzt-dumnea-

Ihr-oder-Apotheker.

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich diese Medien an.

Produkt von -adresați Ihrem-Ihrem-Arzt-oder-Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Als All-Medikamente-Trombafort-kann-Reaktion-ad- verursachen-Schuppen, mit all dem, was niemals allen Menschen erscheint.

Strombafort-Film-zu-therapeutische Dosis-ist-weniger-wahrscheinlich--

Nebenwirkungen zu verursachen. Bei längerer Behandlung

Die folgenden Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet

verfügbar für Datenrate):

Lebertumoren Bei älteren Menschen Hypertrophie und / oder Karzinom

Prostata.

Änderungen in der Blutanalyse, -koagulare-niedrig-zu-Blut-mit-

Trend-the-Blooding.

Side-by-Hipersensibilitate.-

Gonadotropinei - Sekretionsunterdrückung (de-stimulierendes Hormon-SE-xualä).

Bei - Frauen - - dem Auftreten von - Anzeichen - von - Virilisierung - (z. B. - Akne, - Hirsutismus, -

Alopezie-eine-Art-männlich -ingroșarea-irreversibel-eine-Stempelstimme -

Dysmenorrhoe, -hipertrofia-Klitoris) .- Răgușirea-kann-sein-erstes-Semna-

al-change-Ton, der langfristig und ungleich sein kann

irreversibel.

Amenorrhoe-und-Spermatogenezei.-Ginecomastie-Hemmung (mărire-a-

Drüsen und Brust) bei Männern.

Change-Libido.

La-Boys-of-Age-präpubertär the-can-see-erection-frecven-

Sie und erhöhen-Penis-zu-Mädchen --- Stepping-Hairiness-Pubiene-

und Klitorishypertrophie.

Retention, Ödeme, Flüssigkeit-zu-Peripherie -hipercalcemie- (mărire-a-

Kalziumionen des Blutes) - die Männer und Frauen - Progressions-ATE

rosclerozei- (Krankheit-der-Unterwerfung-ein-Fett-zu-Intima-Vase-

Ihre sogenannten Arterien).

Übelkeit, - Wir reduzieren die Lust am Essen.

Störungsfunktion-Leber-Colestazä- (Schwierigkeit-von-Eliberare-

zum Ball) - icter- (gelber Farbstoff in der Haut).

Akne-Hirsutismus- (abnormales Wachstum der Haare) -nesemnificativ.

Retention Natriumionen von Wasser und Körper.

Erhöhung der Konzentration von Parametern in der Biochemie

(Hamstoff-zu-Blut-fähig-Nitrat-positiv, -hipercalcemie) -in-

stationäre Patienten, die eine Diät treffen, die ausschließlich auf das Bett und die Pacientele zugeschnitten ist

mit Krebs und Brustmetastasen.-Modificarea- (positiv) -indicilor-Funktion

Leber.

Wenn irgendwelche Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder wenn ob

servieren alle All-Pass-gelisteten Side-to-the-Leaflet-, -vă-

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen melden

Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt an Ihren Apotheker. Dazu gehören alle möglichen

Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht erwähnt werden.

Sie können Nebenwirkungen von der Systematik in Beziehung setzen
Verbleibende-nationale-de-Berichterstattung -ale-Details-die-veröffentlicht-am-
Website-Agentur-Arzneimittel-und-Medizinprodukte -

www.amed.md-or-email: -farmacovigilenta@amed.md

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie zur Versorgung beitragen

Zusätzliche Informationen zur Arzneimittelsicherheit.

5. Wie lagere ich Strombafort?

Ein Copiilor, der den Anblick und die Reichweite nicht zulässt.

A, um den Ort des Lichts geschützt und bei Temperaturen unter 25 ° C geschützt zu halten.

Verwenden Sie Strombafort nicht nach dem Tag des Ablaufs, der am I eingegeben wurde.

balaj-after- "EXP" -.

Ablaufdatum, um sich auf den letzten Tag der Frage zu beziehen.

Nicht notwendig-sind-spezielle-Bedingungen-von-păstrare.-Medicamentele-

Sie dürfen nicht in Abwasser oder Rückstände geworfen werden

menajere.-Fragen Sie Ihren Apotheker, wie man Medikamente entfernt.

Das-nicht-dein-Mai-ist-notwendig.-Diese-Maßnahmen-werden-dem-Schutz- helfen
die Spülmedien.

6. Paketinhalt und andere Informationen

Was Strombafort enthält

Wirkstoff ist Stanozolol.

1-haltige filmbeschichtete 10 mg Stanozolol oder 50 mg.

Die anderen Komponenten sind:

Ader

Das Magnesiumstearat - Kollidon-CL (Crospovidon) - Cellulose

mikrokristallines Amidonglicolat-Natrium-Ludipress- (Lactozä-

Monohydrat, -polividonä, -crospovidonä).

Film

Das Copolymer aus Polyvinylalkohol und Polyethylenglykol, Talk, -dioxid-

Titan, - Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, - Polyvinylalkohol, -

Farbstoff FD & C Blau-Nr. 1, FD & C-färbig-Blau-Nr.-2.

Wie Strombafort aussieht und Inhalt der Packung

Filmbeschichtet-rund-bikonvex-von-Farbe-blau-des-

chisä.-in-Querschnitt-Inhalt-von-internen-comprimatu-

weiß zu schwarz sein.

Packungsinhalt

Strombafort 10 mg Filmtabletten

By-25-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.

4 Blasen mit der Patientenbroschüre

bringt Kindern einen Sinn für Papp bei.

Strombafort 50 mg Filmtabletten

By-20-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.

3 Blasen mit der Patientenbroschüre

bringt Kindern einen Sinn für Papp bei.

Inhaber der Zulassungsbescheinigung und Hersteller

Inhaber der Registrierungsbescheinigung

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL

str.-N-Grădescu, -4, -MD-2002 -oder.-Chisinau, Programm der Republik Moldau

Der Hersteller

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL

str.-Industrial -7 / A -MD-2091, -oder.-Sîngera Republic Programm Moldawien

Dieser Prospekt wurde im Dezember 2018 genehmigt

Detaillierte Informationen über die Medizin sind verfügbar

Vor-Ort-Agentur-Droge-und-Medizin-Geräte

(AMDM) -http: //nomenclator.amed.md/